

# Checkliste Aufklärungsgespräch

Name Patient \_\_\_\_\_



**BOSCH**



## Vom Arzt auszufüllen

### Einschlusskriterien

- chronische Hepatitis C, gesichert (HCV RNA)
- Genotyp 1a, 1b oder 4
- mind. 18 Jahre
- HZV-Teilnehmer
- Adhärenz erwartet


### Ausschlusskriterien

- HCV-Genotypen 2, 3, 5 oder 6
- Child-Pugh B oder C
- Gleichzeitige Anwendung mit OATP1B-Inhibitoren (z. B. Rifampicin, Atazanavir, Darunavir, Lopinavir, Saquinavir, Tipranavir, Cobicistat oder Ciclosporin)
- Gleichzeitige Anwendung mit CYP3A- oder P-gp-Induktoren (z. B. Efavirenz, Phenytoin, Carbamazepin, Bosentan, Etravirin, Modafinil oder Johanniskraut (Hypericum perforatum) CAVE OTC!)
- Gleichzeitige Anwendung mit starken CYP3A-Inhibitoren ist **nicht empfohlen**

## Aufklärung chronische Hepatitis C

- Bedeutung der Adhärenz/Therapietreue
- Informationen zur Therapie mit ZEPATIER®
- Notwendigkeit Blutuntersuchung und Virustest
- Dauer der Therapie
- Notwendigkeit der Hepatitis B-Bestimmung vor Therapiebeginn
- Aufklärung über mögliche Nebenwirkungen (Hinweis wegen OTC Johanniskraut!)
- Umgang mit Erbrechen nach Tabletteneinnahme oder vergessener Tablette
- Interaktionscheck mit anderen Arzneimitteln und Aufklärung (siehe aktuelle Fachinformation) ggf. Notwendigkeit der Kombination mit Ribavirin  
  - ↳ inkl. Empfängnisverhütung, etc. (laut Fachinformation Ribavirin)
- Abgabe der Patientenmappe mit Informationsmaterialien**

### Entscheidungsbaum bei einer ZEPATIER®-Therapie Therapiedauer und Abrechnungshilfe



# Checkliste Adhärenzgespräche

Name Patient \_\_\_\_\_



**BOSCH**

**BKK**

## Adhärenzgespräch

Bedeutung Adhärenz

Nebenwirkungen  keine  folgende

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

erneuter Interaktionscheck

## Therapieabbruch aufgrund von

Therapeutische Nebenwirkung (z. B. verminderter Appetit, Schlaflosigkeit, Angst, Depression, Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen)

Andere Gründe

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Adhärenzgespräch

Bedeutung Adhärenz

Nebenwirkungen  keine  folgende

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

erneuter Interaktionscheck

## Therapieabbruch aufgrund von

Therapeutische Nebenwirkung (z. B. verminderter Appetit, Schlaflosigkeit, Angst, Depression, Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen)

Andere Gründe

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Adhärenzgespräch

Bedeutung Adhärenz

Nebenwirkungen  keine  folgende

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

erneuter Interaktionscheck

## Therapieabbruch aufgrund von

Therapeutische Nebenwirkung (z. B. verminderter Appetit, Schlaflosigkeit, Angst, Depression, Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen)

Andere Gründe

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Eine Untersuchung auf eine HBV Infektion sollte bei allen Patienten vor Beginn der Behandlung durchgeführt werden. HBV/HCV koinfizierte Patienten haben das Risiko einer HBV Reaktivierung und sollten nach den aktuellen klinischen Leitlinien überwacht und behandelt werden.