

CHECKLISTE - AUFKLÄRUNGSGESPRÄCH



BOSCH

BKK

Name Patient _____

Einschlusskriterien:

- chronische Hepatitis C, gesichert (HCV-RNA)
- Patienten ab einem Alter von 6 Jahren und einem Körpergewicht von mindestens 17 kg
- HZV-Teilnehmer
- Adhärenz erwartet


Ausschlusskriterien:

Gleichzeitige Anwendung von Arzneimitteln, die starke P-Glykoprotein (P-gp)-Induktoren und/oder starke Cytochrom P450 (CYP)-Induktoren sind (Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin, Rifampicin, Rifabutin und Johanniskraut)

Aufklärung chronische Hepatitis C

- Bedeutung der Therapietreue
- Informationen zur Therapie mit EPCLUSA®
- Dauer der Therapie
- Umgang mit Erbrechen nach Tabletteneinnahme oder bei vergessener Einnahme
- Interaktionscheck mit anderen Arzneimitteln, z.B. Amiodaron, und Aufklärung (siehe aktuelle Fachinformation; Hinweis wegen OTC Johanniskraut!)
- Notwendigkeit der Hepatitis-B-Bestimmung vor CHC-Therapiebeginn
- Hinweis an Diabetiker: zu Beginn der Therapie engmaschige Überwachung notwendig
- Anwendung und Dosierung erklärt
- Abgabe Informationsmaterial**

ENTSCHEIDUNGSBAUM BEI EINER EPCLUSA®-THERAPIE: THERAPIEDAUER UND ABRECHNUNGSHILFE



Adhärenzgespräche:	EP-GOP 29
HepB-Coinfektion:	EP-GOP 30
Abschlussgespräch erfolgreich (SVR erreicht):	EP-GOP 31
Abschlussgespräch nicht erfolgreich (SVR nicht erreicht):	EP-GOP 32

* Die Zugabe von Ribavirin kann bei Patienten mit einer Infektion vom GT3 und kompensierter Zirrhose erwogen werden.

CHECKLISTE - AUFKLÄRUNGSGESPRÄCH



Name Patient _____

Adhärenzgespräch

Bedeutung Adhärenz

Nebenwirkungen

keine

folgende:

Erneuter Interaktionscheck

Therapieabbruch aufgrund von

Therapeutische Nebenwirkung z.B. Hautausschlag, Angioödem, Stevens-Johnson-Syndrom (Hautausschlag, der von Fieber, grippeähnlichen Symptomen und Blasenbildung im Mund, Augen und/oder Genitalien begleitet sein kann)*

Andere Gründe:

Adhärenzgespräch

Bedeutung Adhärenz

Nebenwirkungen

keine

folgende:

Erneuter Interaktionscheck

Therapieabbruch aufgrund von

Therapeutische Nebenwirkung z.B. Hautausschlag, Angioödem, Stevens-Johnson-Syndrom (Hautausschlag, der von Fieber, grippeähnlichen Symptomen und Blasenbildung im Mund, Augen und/oder Genitalien begleitet sein kann)*

Andere Gründe:

Adhärenzgespräch

Bedeutung Adhärenz

Nebenwirkungen

keine

folgende:

Erneuter Interaktionscheck


Therapieabbruch aufgrund von

Therapeutische Nebenwirkung z.B. Hautausschlag, Angioödem, Stevens-Johnson-Syndrom (Hautausschlag, der von Fieber, grippeähnlichen Symptomen und Blasenbildung im Mund, Augen und/oder Genitalien begleitet sein kann)*

Andere Gründe:



Eine Untersuchung auf eine HBV-Infektion sollte bei allen Patienten vor Beginn der Behandlung durchgeführt werden. HBV / HCV-koinfizierte Patienten haben das Risiko einer HBV-Reaktivierung und sollten nach den aktuellen klinischen Leitlinien überwacht und behandelt werden.



* Bitte beachten Sie die Pflicht zur Mitteilung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen nach § 6 der Berufsordnung der Landesärztekammer Baden-Württemberg.