

MEDIVERBUND AG • Liebknechtstraße 29 • 70565 Stuttgart

Liebknechtstraße 29
70565 Stuttgart (Deutschland)
Telefon 0711 806079-0
Telefax 0711 806079-555

E-Mail info@medi-verbund.de
www.medi-verbund.de

Ansprechpartner:

Frank Hammer

Telefon (0711) 806079-232
Telefax (0711) 806079-7232
E-Mail frank.hammer@medi-verbund.de

Stuttgart, den 15.12.2025

MEDIVERBUND AG: Newsletter Dezember 2025 - Informationen zur „Blau-Quote“ im Urologie-Facharztvertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie erneut über eine wirtschaftliche Verordnungsweise im Segment der Androgenrezeptor-Signalweg Inhibitoren (ARPI) informieren: Als Rabattarzneimittel steht Erleada® (Apalutamid) den Versicherten der AOK Baden-Württemberg in allen zugelassenen Indikationen als sichere, effektive und wirtschaftliche Therapieoption zur Verfügung. Die im August 2025 aktualisierte deutsche S3-Leitlinie empfiehlt für die Therapie des metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinoms (mHSPC) die hormonbasierten Dualtherapien, bestehend aus Apalutamid (Erleada®) oder Enzalutamid und einer Androgendeprivationstherapie (ADT) (höchster Empfehlungsgrad, A)¹. Aufgrund des Rabattvertrages wird Erleada® im Sinne des Facharztvertrages Urologie in der HZV-Software „blau“ angezeigt.

Der Rabattvertrag leistet einen Beitrag zu mehr Wirtschaftlichkeit im Facharztvertrag Urologie und soll bei der Verordnung eines ARPI in der entsprechenden Indikation berücksichtigt werden. Die Verordnung von Erleada® trägt zur Erreichung der „Blau-Quote“ bei.

Die zugelassenen Anwendungsgebiete können der Tabelle 1 entnommen werden. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den aktuellen Fachinformationen (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, SmPC).

Tabelle 1: Übersicht zugelassene Anwendungsgebiete, +: zugelassen; **Blau**: Rabattvertrag

Fertig-Arzneimittel (Wirkstoff)	nicht metastasiertes hormonsensitives Prostatakarzinom (nmHSPC)	metastasiertes hormonsensitives Prostatakarzinom (mHSPC)	nicht metastasiertes kastrations-resistentes Prostatakarzinom Hochrisiko (nmCRPC)	metastasiertes kastrations-resistentes Prostatakarzinom (mCRPC)	progredientes metastasiertes kastrations-resistentes Prostatakarzinom (mCRPC)
Erleada® (Apalutamid)		+	+		
Nubeqa® (Darolutamid) (+/- Docetaxel)		+	+		
Xtandi® (Enzalutamid)	+	+	+	+	+

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MEDIVERBUND Team

¹ S3-Leitlinie Prostatakarzinom – Version 8.1, Stand August 2025:
<https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/prostatakarzinom>
(letzter Zugriff: 01.12.2025)

Fachinformation:

ERLEADA® 60 mg Filmtabletten, ERLEADA® 240 mg Filmtabletten. Wirkstoff: Apalutamid. **Zusammensetzung:** **ERLEADA® 60 mg:** Jede Filmtabl. enth. 60 mg Apalutamid. Sonst. Bestandt.: Tabl.kern: Hochdisp. Siliciumdioxid, Croscarmellose-Natrium, Hypromelloseacetatsuccinat, Magnesiumstearat, mikrokrist. Cellulose; Filmüberzug: Eisen(II,III)-oxid (E172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Macrogol, Poly(vinylalkohol), Talkum, Titandioxid (E171). **ERLEADA® 240 mg:** Jede Filmtabl. enth. 240 mg Apalutamid. Sonst. Bestandt.: Tabl.kern: Hochdisp. Siliciumdioxid, Croscarmellose-Natrium, Hypromelloseacetatsuccinat, Magnesiumstearat, mikrokrist. Cellulose, Siliciumdioxid-beschichtet. Filmüberzug: Glycerolmonocaprylocaprat (Ph.Eur.) (Typ I), Eisen(II,III)-oxid (E172), Poly(vinylalkohol), Talkum, Titandioxid (E171), Macrogol-Poly(vinylalkohol)-Pfropfcopolymer. **Anw.geb.:** Bhdg. erwachs. Männer m. nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nm-CRPC), d. e. hohes Risiko f. d. Entwickl. v. Metastasen aufweisen, Bhdg. erwachs. Männer m. metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (mHSPC) i. Komb. m. ADT (Androgendeprivationstherapie). **Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Schwangersch. od. Frauen, d. schwang. werden könnten, Stillzeit. **Nebenwirk.:** Vermind. Appetit, Hitzewallung, Hypertonie, Diarrhö, Hautausschl., Fraktur, Arthralg., Ermüdung, Gewichtsverlust, Sturz, Hypothyreose, Hypercholesterin., Hypertriglyzerid., Dysgeusie, ischäm. Herzerkr., ischäm. zerebrovask. Erkr., Pruritus, Alopezie, Muskelspasm., Krampfanf., Restless-Legs-Syndr., QT-Zeitverläng., Stevens-JohnsonSyndr./tox. epiderm. Nekrolyse, Arzneimittelw. m. Eosinophilie u. system. Sympt., lichenoider Ausschlag, interstitielle Lungenerkr.. **Warnhinw.:** Arzneimittel f. Kdr. unzugängl. aufbew. **Verschreibungspflichtig.** **Pharmazeut. Unternehmer:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien. **Örtl. Vertreter für Deutschland:** Janssen-Cilag GmbH, Johnson & Johnson Platz 1, D-41470 Neuss. **Stand d. Inform.:** 11/24.

